

ستوبادول

فورت

ستوبادول فورت باراسيتامول ١٠٠٠ مجم بودرة فوارة في أكياس

ما هو ستوبادول فورت و ما هي استخدمته ؟

يعد ستوبادول فورت فعال في تخفيف الآلام و الحمي، فهو يستخدم لتخفيف الآلام مثل :

- ألم العضلات والعظام هشاشة العظام (حالة المفاصل التنكسية)، التهاب المفاصل الروماتويدي (التهاب المفاصل يشمل عادة المفاصل بين اليدين والقدمين ويؤدي إلى تورم والألم) ، صداع ، ألم الأسنان، عسر الطمث، الحمى

ما يجب أن تعرفه قبل تناول ستوبادول فورت

لا تتناول باراسيتامول:

إذا كنت تعاني من حساسية شديدة الباراسيتامول أو أي من المكونات الأخرى للمستحضر

إذا كان لديك مرض في الكبد.

توخي الحظر عند تناول ستوبادول فورت:

إذا كنت تعاني من أمراض الكلى ، القلب، الرئة أو إذا كنت تعاني من فقر الدم (انخفاض هيموجلوبين الدم الذي يمكن أن يحدث بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء) ، يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

إذا كنت مدمناً للكحوليات، يجب أن تكون حريصاً على عدم تناول أكثر من ٢ جم من باراسيتامول يومياً.

يجب أن تكون حذراً إذا كنت مصاباً بالربو ولديك حساسية من حمض أسيتيل ساليسيليك لأنه قد يحدث تفاعل بينهم.

يجب ألا تتجاوز الجرعة الموصى بها. يجب عليك استشارة الطبيب عند استخدامه في الأطفال دون سن ١٥ عاماً أو في العلاج الأكثر من ١٠ أيام يوحى باستشارة طبيبك أو الصيدلي إذا كان عليك إجراء فحص دم أو بول ستوبادول

ستوبادول فورت والأدوية الأخرى

• آخر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

على وجه الخصوص، إذا كنت تستخدم أي من الأدوية التالية ، فقد يكون من الصور تعديل الجرعة أو التوقف عن تناول العلاج:

- المضادات الحيوية مثل كلورامفينيكول.
- مضادات التخثر، الأدوية التي تمنح تكون جلطات الدم مثل أمينوك مارول و وارفارين
- مواقع الحمل الفموية وعلاجات الاستروجين.
- مضادات الصرع مثل لاموتريجين ، فينيتوين، فينوبلبن ، مثل فنوباريتال ، بريمدون و كاربامازين
- أدوية علاج السل مثل إيزونيازيد و ريفاميسين
- باريبتورات الذي يستخدم كمثوم ، مهدى و مضاد للتشنج وكولي امين الذي استخدم لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
- الأدوية المستخدمة لعلاج النقرس مثل بروبينيد
- مدرات البول مثل فوروسيميد.
- الأدوية المستخدمة لتخفيف التشنجات لو تقلصات المعدة والأمعاء والمثانة مثل مجالات الكولين.
- الأدوية المستخدمة لعلاج القلب مثل ديجيتالس جليكوسيدات
- أدوية علاج الغثيان والقيء مثل مينوكلوبرواميد و دوبيرون
- أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب مثل بروبرانولول
- زيدوفودين يستخدم في علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية)
- لا ينبغي استخدام باراسيتامول مع مسكنك الألم الأخرى دون استشارة طبيبك لا ينصح باستخدام المطول والمتزامن الباراسيتامول مع ساليسيلات (نوع من مضادات الالتهاب) لأن يقول جرعات كثيرة من مسكنات الألم
- يزيد بشكل كبير من خطر سمية الكلى.
- لتجنب خطر الجرعة الزائدة ، عليك التحقق من عدم تناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول

الحمل و الرضاعة الطبيعية

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

الحمل:

لا ينصح بتناوله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وفي حالة التناول ، يجب أن يتم دائماً مقارنة المخاطر والفوائد المحتملة للعلاج. إذا لزم الأمر يمكن تناول باراسيتامول أثناء الحمل. يجب عليك تناول أقل جرعة ممكنة لتقليل الألم أو الحمى لأقصى وقت ممكن اتصل بطبيبك إذا لم تشعر بتحسن أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء في كثير من الأحيان.

الرضاعة

يُمنع باراسيتامول في حليب الأم لذا يجب على النساء المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

ليس له تأثير على القيادة واستخدام الآلات.

كيفية تناول ستوبادول فورت

يجب تناول هذا الدواء تماماً حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد

يتم تناول ستوبادول فورت من طريق الفم بعد اذابة محتويات الكيس في كوب من الماء. يستخدم فقط للبالغين والأطفال فوق ١٥ سنة.

الجرعة المعتادة هي كيس واحد كل 6-8 ساعات دون تجاوز 4 جرام (4 أكياس) من باراسيتامول كل ٢٤ ساعة

قد يوصي الطبيب بتخفيض الجرعة للمرضى المسنين. في حالة الفشل الكلوي الحاد، سيكون الفاصل الزمني بين الجرعات ٨ ساعات على الأقل. تناول دائماً أقل جرعة ممكنة.

بتم تناول المستحضر عند وجود أعراض مؤلمة أو حمي، مع اختفاء هذه الأعراض يتم التوقف عن تناول هذا الدواء.

إذا تناولت باراسيتامول أكثر مما يجب

في حالة الجرعة الزائدة أو الابتلاع بالخطأ والوجه فوراً إلى المستشفى مع احضار العبوة و النشرة الداخلية لبراها الطبيب واخبره بالكمية التي تم ابتلاعها.

إذا كنت قد تناولت جرعة زائدة، فيجب عليك الذهاب إلى المستشفى فوراً حتى إذا لم تكن هناك أعراض ، حيث لا تظهر هذه الأعراض حتى 3 أيام بعد تناول الجرعة الزائدة حتى في حالات التسمم الحاد.

قد تكون أعراض الجرعة الزائدة: الدوخة، التقيؤ، فقدان الشهية، إصفرار الجلد والعينين ، ألم في البطن.

قد يكون المرضى الذين يتناولون الباربيتورات أو الكحوليات المزمنة ، أكثر موجهة لسمية جرعة زائدة من برامينامول

إذا نسيت تناول ستوبادول فورت

لا تأخذ جرعة مضاعفة التمرير الجرعة المنسية .

إذا نسيت تناول الجرعة في موعدها، تناولها بمجرد أن تتذكر، ثم انتظر 4 ساعات على الأقل لتناول الجرعة التالية

إذا توقفت من تناول ستوبادول فورت

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول تناول هذا المستحضر ، اسأل طبيبك أو الصيدلي

الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب باراسيتامول آثاراً جانبية برغم ذلك لا تحدث لكل من يتناوله.

يتم تصنيف الآثار الجانبية كالآتي:

شائعة بعد أننى ١ من بين ١٠٠ مريض

كلمة بعد أدنى ١ من بين ١٠٠٠ مريض ، الكرة بعد أدنى

من بين ١٠٠٠٠ مريض) ، نادرة جداً بعد انقل الي كل ١٠٠٠ مريض

الاضطرابات العامة

نادراً: تورعك

اضطرابات المعدة والأمعاء

نادراً: زيادة مستويات الزهات الكدير قلب او الكلام

اضطرابات الأوعية الدموية

نادراً: تخفض ضغط الدم

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كان لديك أي آثار جانبية، برجاء التحدث مع الطبيب أو الصيدلي. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق مركز البقطة الدوائية المصرية رقم الهاتف ٢٠٢٠ (٢٣٦٨٤٣٨١، ٢٣٦٨٤٣٨١، ٢٣٦٨٤٣٨١، ٢٣٦٨٤٣٨١) الخط الساخن (١٥٣٠١) أو عن طريق

pv.followup@edaegypt.gov.eg

المصنع ومالك الرخصة

تصنيع شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية-إيفا فارما

