

ستوبادول نايت باراسيتامول ٥٠٠ مجم & دايفينهيدرامين هيدروكلوريد ٢٥ مجم أقراص مغلفة

ما هو ستوبادول نايت وما هي استخداماته ؟

يستخدم ستوبادول نايت لتخفيف الآلام التي تتسبب في منعك من النوم . و أيضاً مسكن للآلام الأخرى مثل الصداع ، الصداع النصفي ، آلام الظهر ، آلام المفاصل والعضلات ، آلام الأسنان أو آلام الدورة الشهرية.
المواد الفعالة هي الباراسيتامول ودايفينهيدرامين هيدروكلوريد. باراسيتامول هو مسكن للألم ودايفينهيدرامين هيدروكلوريد هو مضاد للهستامين يسبب النعاس مما يجعله مفيداً عندما يتسبب الألم في منعك من النوم .

ما يجب أن تعرفه قبل تناول ستوبادول نايت

لا تتناول ستوبادول نايت :
- إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه باراسيتامول أو دايفينهيدرامين هيدروكلوريد أو أي من المكونات الأخرى.
- إذا كنت تعاني من البرفيرية - إذا كنت قد تناولت أي دواء آخر يحتوي على باراسيتامول خلال الأربع ساعات الماضية.
لا تتناول أي منتجات أخرى تحتوي على مضادات الهيستامين ، بما في ذلك المنتجات المستخدمة على جللك أو في أدوية السعال والبرد.

التحذيرات و الاحتياطات

استشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى ، بما في ذلك مرض الكبد الكحولي ، أو إذا كنت تعاني من نقص الوزن أو سوء التغذية أو تشرب الكحوليات بانتظام. قد تحتاج إلى تجنب استخدام هذا المنتج تماماً أو الحد من كمية الباراسيتامول التي تتناولها .
- إذا كنت تعاني من الصرع أو -النوبات التشنجية / انسداد في معدتك أو أمعائك (على سبيل المثال بسبب القرحة) / صعوبة في التبول / زرق ضيق الزاوية / تضخم في البروستاتا. / الوهن العضلي الوبيل / إذا كنت تعاني من الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن / إذا كنت مصاباً بعدوى شديدة أو تعاني من سوء التغذية الحاد أو نقص الوزن الشديد أو تتناول الكحوليات بشكل مزمن ، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالحمى الأيضي وتشمل أعراض الحمى الأيضي ما يلي:
- تنفس عميق وسريع وصعب / الغثيان والقيء / فقدان الشهية
اتصل بالطبيب على الفور إذا حدث لك مزيج من هذه الأعراض.

القيادة واستخدام الآلات

لا تقود السيارة أو تستخدم الآلات لأن ستوبادول نايت قد يسبب النعاس بعد تناول الجرعة بوقت قصير.
لا تتناول الكحوليات مع ستوبادول نايت .

ستوبادول نايت و الأدوية الأخرى

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذه الأقراص إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى موصوفة مثل :
- مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (MOAIs) خلال آخر اسبوعين .
- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات / الأتروبين و حاصرات بيتا / ميتوكلوراميد أو دومبيريدون / ميتوبولول ، فينلافكسين ، كوليسترامين / ديسيكوفيرين / الهيوسين -أدوية علاج القلق أو أدوية علاج الارق ؛ الأدوية التي تجعلك تشعر بالنعاس أو تسبب لك جفاف الفم .
- الأدوية التي ترقق الدم (مضادات التخثر مثل وارفارين)
- مسكنات الألم مثل كوديين .

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا تتناولي ستوبادول نايت أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية .

كيفية تناول ستوبادول نايت

البالغين (بما في ذلك كبار السن) والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ سنة وما فوق:
- قم ببلع قرصين مع الماء قبل النوم ب ٢٠ دقيقة / لا تتناول أكثر من قرصين في خلال ٢٤ ساعة.
- لا تتناول ستوبادول نايت إذا كنت قد تناولت بالفعل ٤ جرعات من أي مستحضر آخر يحتوي على باراسيتامول خلال النهار / لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها.
- لا تتناوله إذا كان عمرك أقل من ١٦ سنة.

إذا تناولت أقراص أكثر مما يجب

تحدث إلى الطبيب في الحال إذا تناولت الكثير من هذا الدواء حتى لو كنت تشعر أنك بخير وذلك لأن الجرعة الزائدة من باراسيتامول يمكن أن تسبب تلف كبدي خطير متأخر .

لا تتناول ستوبادول نايت لأكثر من أسبوع

إذا استمرت الآلام المصاحبة للنوم - لأكثر من أسبوع أو إذا استمر الصداع ، استشر طبيبك.

الآثار الجانبية المحتملة :

مثل كل الأدوية ، يمكن أن يسبب ستوبادول نايت آثاراً جانبية و رغم ذلك لا تحدث لكل من يتناوله .
لا ينبغي إعطاء هذا الدواء لكبار السن المصابين بالارتباك .

قد يحدث حالات نادرة جداً من ردود الفعل الجلدية الخطيرة . توقف عن تناول هذا الدواء وأخبر طبيبك على الفور إذا واجهت : - ردود فعل تحسسية شديدة مثل الطفح الجلدي والحكة المصحوبين أحياناً بتورم الفم أو الوجه أو ضيق التنفس - ضيق الصدر أو زيادة كثافة البلغم - صعوبة في التبول ، صداع - اضطراب المعدة ، غثيان أو قيء
- مشاكل في التنفس. تزداد احتمالية حدوثها إذا كنت قد اخترتها من قبل عند تناول مسكنات الألم الأخرى - النوبات التشنجية أو صعوبة التنسيق العضلي - تغيرات في نظم القلب - كدمات أو نزيف غير مبرر - تكرار الحمى أو العدوى
- غثيان ، فقدان الوزن المفاجئ ، فقدان الشهية وإصفرار العين والجلد.
عند استخدام هذا المستحضر قد تواجه:

- نعاس، سكون، عدم الاتزان ، دوخة ، ارهاق ، عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز - جفاف الفم - شعور بالتلملل أو سرعة الأفعال ، ارتباك - احساس بالوخز في الجلد - نُفْضَانُ غَضْطِيّ

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كان لديك أي آثار جانبية، برجاء التحدث مع الطبيب أو الصيدلي . ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق مركز البقظة الدوائية المصرية رقم الهاتف +٢٠٢ (٢٣٦٨٤٢٨٨، ٢٣٦٨٤٣٨١، ٢٣٦٨٤٣٨٠، ٢٣٦٨٤٣٨٠) الخط الساخن (١٥٣٠٣) أو عن طريق

pv.followup@edaegypt.gov.eg

المصنع ومالك الرخصة

تصنيع شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية-إيفا فارما