

ستوبادول باراسيتامول 650 مجم

دواعى الاستعمال :

يعد ستوبادول ممتد المفعول فعال لتخفيف الألم المستمر المرتبط بالتهاب مفاصل العظام ، آلام العضلات وآلام الظهر.
ستوبادول ممتد المفعول يستخدم أيضاً في التخفيف المؤقت السريع والفعال للألم و عدم الراحة المرتبطة بصداع الرأس ، الصداع التوترى ، آلام الدورة الشهرية ، وجع الأسنان والألم ما بعد عمليات الأسنان ،
الرشح و حالات برد . باراسيتامول يستخدم أيضاً في تخفيض درجة الحرارة

الجرعة و طريقة الاستخدام

- البالغون والأطفال بعمر 12 سنة وما فوق: قرصين ثلاث مرات في اليوم ، كل 6 إلى 8 ساعات . لا تتناول أكثر من 6 أقراص خلال 24 ساعة. قم ببلع الأقراص كاملة .
- تناول فقط باراسيتامول لبضعة أيام في الوقت المحدد ما لم يطلب منك طبيبك تناوله لفترة أطول.
- لا ينصح به للأطفال دون سن 12 عاماً. ولا يستخدم لأكثر من 48 ساعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 17 عام إلا باستشارة الطبيب .
- قم ببلع الأقراص بالكامل بالماء أو السوائل الأخرى.
- لا تسحق الأقراص أو تمصها لأن ذلك يضعف خاصية المفعول الممتد . يمكن أن تؤخذ مع أو بدون الطعام.
- يجب أن تكون الجرعات متباعدة بالتساوي على مدار اليوم. الحد الأدنى للجرعات 6 ساعات.
- يجب عدم سحق الأقراص. لا تتعدى الجرعة المحددة.
- لا تكرر الجرعة قبل 6 ساعات.
- لا تتناول الدواء مع أى مستحضر آخر يحتوى على باراسيتامول.

موانع الأستعمال

لا تتناول ستوبادول:

إذا كنت تعاني من حساسية شديدة لباراسيتامول أو أي من المكونات الأخرى للمستحضر .

التحذيرات و الاحتياطات:

لا تتناول ستوبادول مع أي منتجات أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد يؤدي الاستخدام المتزامن مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الباراسيتامول إلى جرعة زائدة.
قد تسبب الجرعة الزائدة من الباراسيتامول فشل الكبد الذي قد يتطلب زرع كبد أو يؤدي إلى الوفاة. يزيد مرض الكبد الأساسي من خطر تلف الكبد المرتبط بالباراسيتامول. يجب على المرضى الذين يعانون من ضعف في الكبد أو الكلى طلب المشورة الطبية قبل تناول هذا الدواء.

قد تم الإبلاغ عن حالات اختلال أو فشل في وظائف الكبد في المرضى الذين يعانون من نقص مستويات الجلوتاثيون في الحالات التالية :

- سوء التغذية الحاد.و فقدان الشهية.

- إنخفاض مؤشر كتلة الجسم .

- إذا كنت شرباً للمشروبات الكحولية وبشكل مزمن أو تعاني من تعفن الدم .

قد يزيد استخدام الباراسيتامول من خطر حدوث الحمض الابيض في المرضى الذين يعانون من حالات نقص الجلوتاثيون .

إذا استمرت الأعراض ، يجب طلب المشورة الطبية. يُحفظ بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال .

أن العلامات السريرية لإصابة الكبد التي تحدث عند تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول تظهر عادة بعد 24 إلى 48 ساعة وتبلغ ذروتها عادة بعد 4 إلى 6 أيام.

نظراً لأن الشكل الصيدلي للمستحضر هو أقراص ممتدة المفعول من الباراسيتامول ، فإن الامتنصاص يدوم لفترة أطول في حالة زيادة الجرعة.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى :

قد تتداخل بعض الأدوية مع باراسيتامول مثل : مضادات التخثر (وارفارين وكومارين) - ميتوكلوپراميد - الكحول أو الأدوية المضادة للصرع – بروينيسيد - كوليسترامين.

الحمل و الرضاعة الطبيعية

باراسيتامول قد يستخدم أثناء الحمل إذا لازم الأمر . يجب عليك استخدام أقل جرعة ممكنة تقلل من ألمك أو من الحمى ويجب استخدامها لأقل فترة ممكنة . تواصل مع طبيبك في حالة أن الألم أو الحمى لا تنخفض أو في حالة أنك تحتاجين إلى تناول الدواء بجرعة أعلى .

الحمل: كما هو الحال مع استخدام أي دواء أثناء الحمل ، يجب على المرأة الحامل طلب المشورة الطبية قبل تناول الباراسيتامول. يجب مراعاة أقل جرعة فعالة لأقل وقت ممكن

الرضاعة الطبيعية:

يتم إفراز الباراسيتامول في حليب الثدي و لكن أثبتت الدراسات أن ذلك لا يشكل أى خطر على الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية .

تعتمد هذه النتائج على المستحضرات فورية المفعول ولا توجد بيانات متاحة عن المستحضرات الممتدة المفعول.

الآثار الجانبية المحتملة

الآثار الجانبية الواردة من بيانات التجارب السريرية السابقة هي نادرة وناتجة عن تعرض المرضى الصغار ووفقاً لذلك ، فإن الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية ناتجة عن تجربة تسويقية بالجرعة العلاجية /الموصوفة وتم سردها في الجدول التالي :

اضطرابات الدم والجهاز الليمفاوي : نادر جداً: نقص الصفائح الدموية .

اضطرابات جهاز المناعة : نادر جداً: فرط الحساسية مثل الطفح الجلدي ،أدوما ، متلازمة ستيفن جونسون و التحلل التسمي للجلد .

اضطرابات الجهاز التنفسي : نادر جداً: التشنج القصبي و خصوصاً في المرضى الذين لديهم حساسية من الاسبرين و مضادات الالتهابات غير الأستيرويدية الاخرى .

اضطرابات الجهاز الهضمي : نادر جداً : اختلال وظائف الكبد .

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كان لديك أي آثار جانبية، برجاء التحدث مع الطبيب أو الصيدلي .ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة.يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق مركز اليقظة الدوائية المصرية رقم الهاتف +202(23684288،23684381،23640368،23648046) خارجى (1303) وعن طريق البريد الإلكتروني التالي: pv.center@eda.mohealth.gov.eg. ذلك حيث ان الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية يمكن أن يساعد في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

الجرعة الزائدة:

قد تسبب الجرعة الزائدة من الباراسيتامول فشل الكبد الذي قد يتطلب زرع كبد أو يؤدي إلى الوفاة.

تم ملاحظة حدوث التهاب البنكرياس الحاد مع اختلال وظائف الكبد وتسمم الكبد .

في حالة تناول جرعة زائدة ، قم بالذهاب إلى أقرب مستشفى على الفور حتى لو لم تكن هناك علامات على عدم الراحة أو التسمم بسبب خطر حدوث فشل الكبد.

في حالة تناول جرعة زائدة ، تعتبر طرق تقليل امتصاص الدواء مهمة. قد يقلل الفحم من امتصاص الباراسيتامول إذا تم تناوله في غضون ساعتين بعد تناول الباراسيتامول عن طريق الفم.

نظراً لأن الشكل الصيدلي للمستحضر هو أقراص ممتدة المفعول من الباراسيتامول ، فإن الامتنصاص يدوم لفترة أطول في حالة زيادة الجرعة وقد يحدث الحد الأقصى لتكرار البلازما لاحقاً ، وقد تستمر التركيزات العالية ، خاصة بعد الجرعات الكبيرة ، لعدة أيام .

في حالة تناول جرعة زائدة من باراسيتامول تصل إلى 10 مجم أو أكثر أو عندما تكون الجرعة المتناولة

غير معروفة . يجب البدء فوراً بعلاج إن – أستيل سيستين .

عند تناول جرعة زائدة أقل من 10 مجم و الوقت الذى تم تناول الجرعة فيه غير معروف . يتم أخذ عينات متعددة على فترات زمنية مناسبة على سبيل المثال بعد 4 و 6 و 8 ساعات بعد تناول الجرعة الزائدة .

يجب أخذ عينات أخرى في الاعتبار إذا لم تنخفض مستويات الباراسيتامول في الدم. إذا كان مستوى الدواء أعلى أ من الخط العلاجي الخاص بنوموجرام الجرعة الزائدة للباراسيتامول فإنه ينصح باستخدام إن –

أستيل سيستين. إذا كان وقت تناول الجرعة الزائدة غير معروف أولاً يمكن الحصول على مستوى الباراسيتامول في الدم في غضون 8 ساعات من الجرعة الزائدة ، فمن المستحسن البدء بعلاج إن – أستيل

سيستين.

المراجع: النشرة الداخلية ل ستوبادول 650 مجم ممتدة المفعول بتاريخ 12 – 7 -2021

تصنيع شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية(إيفا فارما)