



ستوبادول كولد آند فلو

ما هو ستوبادول كولد آند فلو و ما هي استخداماته؟

ستوبادول كولد آند فلو كبسولات تستخدم في تخفيف الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا ، بما في ذلك تخفيف الأوجاع والآلام ، التهاب الحلق ، الصداع ، احتقان الأنف ، خافض للحرارة و علاج السعال الصدري.

- باراسيتامول و هو مسكن للألم و فعال ضد الأوجاع والآلام بما في ذلك الصداع و خافض للحرارة.

- جوايفنارزين وهو طارد للبلغم عند المعانة من السعال الصدري

- فينيل أفرين هيدروكلورايد و هو مزيل للاحتقان لإزالة إنسداد الأنف و يقلل من الضغط الذي قد يسبب الصداع.

ما يجب أن تعرفه قبل تناول ستوبادول كولد آند فلو:

لا تتناول ستوبادول كولد آند فلو في الحالات الآتية:

* إذا كان لديك حساسية من باراسيتامول ، جوايفنارزين ، فينيل أفرين أو لا ي من مكونات المستحضر.

* إذا كان تعاني من أمراض القلب الخطيرة أو فرط نشاط الغدة الدرقية

* إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم .

* إذا كنت كنت تستخدم أو استخدمت في الأسبوعين الماضيين أحد الأدوية المثبتة لأنزيم أو كسيديز أحدى الامين الذي يستخدم لعلاج الإكتئاب.

* إذا كان لديك تضخم في البروستاتا

* إذا كنت تتناول أدوية أخرى مزيلة للاحقان

التحذيرات والاحتياطيات :

تحذر إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل تناول ستوبادول كولد آند فلو كبسولات إذا:

* كنت تعاني من مشاكل في الكبد ، الكلى أو من أمراض القلب

* كنت تعاني من متلازمة رينود ، أو داء السكري.

* تعاني من الجلوكوما

ستوبادول كولد آند فلو والأدوية الأخرى:

لا تتناول أي عقار آخر يحتوى على الباراسيتامول. لا تتناول العقار مع أي عقار آخر للبرد أو الإنفلونزا أو إحتقان الأنف

تناول الدواء مع الطعام أو الشراب و لا تتناول كميات كبيرة من الكحول.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

لا ينبغي استخدام هذا الدواء مع النساء اللواتي لديهن تاريخ من تسمم الحمل.

تحذر إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ستوبادول كولد آند فلو إذا كنت حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين لحدث حمل.

إذا لزم الأمر، يمكن استخدامه أثناء الحمل. يجب عليك استخدام أقل جرعة ممكنة و استخدامها لأقصر وقت ممكن لتنقيل الألم و/أو الحمى. اتصل بطبيبك إذا لم يقل الألم أو الحمى أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء بجرعة أعلى.

كيفية تناول ستوبادول كولد آند فلو:

يجب ابتلاع الكبسولة كاملة بالماء. لا تمضغ. من المهم شرب الكثير من السوائل عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

الجرعة

البالغين ، كبار السن والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق:

*تناول 2 كبسولة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة و لا تتناول أكثر من 8 كبسولات خلال 24 ساعة

*لا يعطى للأطفال أقل من 16 سنة

*إذا استمرت الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام ، أو ساعتين ، استشر طبيبك.

إذا تناولت الدواء أكثر مما ينبغي

تحذر إلى طبيبك فوراً حتى إذا كنت تشعر أنك بحالة جيدة لأن كثرة الباراسيتامول قد تؤدي إلى تلف خطير و متأخر بالكبد. قد تشعر بدوار ، خفقان ، آلام في المعدة أو

ارتفاع ضغط الدم مع صداع إذا كنت تناولت الدواء أكثر مما ينبغي.

إذا نسيت تناول هذا الدواء:

يجب استخدام هذا الدواء فقط عند الضرورة و لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا كان لديك أي سئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، استشر الطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية المحتملة :

مثل كل الأدوية الأخرى ، قد يؤدى ستوبادول كولد آند فلو إلى أعراض جانبية ولكنها قد لا تصيب جميع المرضى.

*تقاعلات حساسية التي قد تكون شديدة مثل طفح جلدي.

*اضطرابات الدم ، مثل قلة الصفيحات ، قلة كرات الدم البيضاء ، قلة الكريات الشاملة ، قلة العدلات وندرة المحببات.

*تم الإبلاغ عن حالات نادرة جدا من ردود فعل جلدية خطيرة.

*غثيان وقيء - مشاكل بالأمعاء - صعوبة في التبول و خاصة في الرجال

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كان لديك أي آثار جانبية، برجاء التحدث مع الطبيب أو الصيدلي. يمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق مركز اليقطة الدوائية المصرية رقم الهاتف ١٥٣٠ و ذلك حيث ان الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية يمكن أن يساعد في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

المرجع: نشرة ستوبادول كولد آند فلو المعتمدة من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 28-12-2020 تصنيع شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية