

ما هو ستوبادول فورت و ما هي استخداماته ؟

يعد ستوبادول فورت فعال في تخفيف الآلام و الحمى ، فهو يستخدم لتخفيف الآلام مثل :

- آلم العضلات والعظام - هشاشة العظام (حالة المفاصل التنكسية)
- التهاب المفاصل الروماتويدي (التهاب المفاصل يشمل عادة اليدين والقدمين ويؤدي إلى التورم والألم)
- صداع - آلام الأسنان - عسر الطمث - الحمى

ما يجب أن تعرفه قبل تناول ستوبادول فورت

لا تتناول باراسيتامول: إذا كنت تعاني من حساسية شديدة للباراسيتامول أو أي من المكونات الأخرى للمستحضر أو إذا كان لديك مرض في الكبد.

توخي الحظر عند تناول ستوبادول فورت :

- إذا كنت تعاني من أمراض الكلى ، القلب ، الرئة أو إذا كنت تعاني من فقر يجب عليك استشارة طبيب قبل تناول هذا الدواء .
- إذا كنت مدمنًا للكحوليات ، يجب أن تكون حريصًا على عدم تناول أكثر من ٢ جم من باراسيتامول يوميًا .
- يجب أن تكون حذرًا إذا كنت مصابًا بالربو ولديك حساسية من حمض أسيتيل ساليسيليك لأنه قد يحدث تفاعل بينهم .
- يجب ألا تتجاوز الجرعة الموصى بها .
- يجب عليك استشارة الطبيب عند استخدامه في العلاج لأكثر من ١٠ أيام .

الاضطرابات العامة:

نادرًا: توعك

نادرًا جدًا: تفاعلات حساسية تتراوح من طفح جلدي بسيط إلى شرى و صدمة الحساسية.

اضطرابات المعدة والأمعاء:

نادرًا: زيادة مستويات إنزيمات الكبد.

نادا جدا: تسمم الكبد واليرقان.

اضطرابات التمثيل الغذائي والتغذية:

نادرًا جدا: نقص السكر في الدم.

اضطرابات الدم والجهاز الليمفاوي

نادرًا جدًا: انخفاض الصفائح الدموية وانخفاض خاليا الدم البيضاء في الدم، فقر الدم النحالي

اضطرابات الوعية الدموية

نادرًا: انخفاض ضغط الدم

اضطرابات الكلى:

نادر جدًا: بول معتم ، تأثيرات سلبية على الكلى.

تم الإبلاغ عن حالات نادرة جدًا من ردود الفعل الجلدية الشديدة.

الحمل و الرضاعة الطبيعية

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء .

لا ينصح بتناوله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، وفي حالة التناول ، يجب أن يتم دائمًا مقارنة المخاطر والفوائد المحتملة للعلاج. إذا لزم الأمر يمكن تناول باراسيتامول أثناء الحمل.

يجب عليك تناول أقل جرعة ممكنة لتقليل الآلام أو الحمى لأقصر وقت ممكن. اتصل بطبيبك إذا لم تشعر بتحسن أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء في كثير من الأحيان

الرضاعة

يمر باراسيتامول في حليب الأم لذا يجب على النساء المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء .

كيفية تناول ستوبادول فورت

يجب تناول هذا الدواء تمامًا حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكدًا. يتم تناول ستوبادول فورت عن طريق الفم بعد أذابة محتويات الكيس في كوب من الماء. يستخدم فقط للبالغين والأطفال فوق ١٥ سنة. الجرعة المعتادة هي كيس واحد كل ٦-٨ ساعات دون تجاوز ٤ جرام (٤ أكياس) من باراسيتامول كل ٢٤ ساعة.

قد يوصي الطبيب بتخفيض الجرعة للمرضى المسنين.

في حالة الفشل الكلوي الحاد ، سيكون الفاصل الزمني بين الجرعات ٨ ساعات على الأقل.

ستوبادول فورت والأدوية الأخرى

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى ، بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

على وجه الخصوص ، إذا كنت تستخدم أيًا من الأدوية التالية ، فقد يكون من الضروري تعديل الجرعة أو التوقف عن تناول العلاج :

- المضادات الحيوية مثل كلورامفينيكول.

- مضادات التخثر ، الأدوية التي تمنع تكون جلطات الدم مثل أسينوكومارول و وارفارين. 7

-موانع الحمل الفموية وعلاجات الاستروجين.-

- مضادات الصرع مثل لاموتريجين ، فينيتوين ، فينوباربیتال ، ميثيل فينوباربیتال ، بريميدون و كاربامازيبين.

- أدوية علاج السل مثل إيزونيازيد و ريفامبيسين.

- باربيتورات الذي يستخدم كمونم ، مهدئ و مضاد للتشنجات و كوليسترامين الذي يستخدم لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- الأدوية المستخدمة لعلاج النقرس.

- مدرات البول مثل فوروسيميد .

- الأدوية المستخدمة لتخفيف التشنجات أو تقلصات المعدة والأمعاء والمثانة مثل مضادات الكولين.

- الأدوية المستخدمة لعلاج القلب مثل ديجيتالس جليكوسيدات

- أدوية علاج الغثيان والقيء مثل ميتوكلوبراميد ودومبيريدون.

- أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب مثل بروبرانولول.

لا ينبغي استخدام باراسيتامول مع مسكنات الألم الأخرى دون استشارة طبيبك. لا ينصح بالاستخدام المطول والمتزامن للباراسيتامول مع ساليسيلات لأن تناول جرعات كثيرة من مسكنات

الألم يزيد بشكل كبير من خطر سمية الكلى.

لتجنب خطر الجرعة الزائدة ، يجب عليك التحقق من عدم تناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول .

المراجع: النشرة الداخلية لمنتج ستوبادول فورت بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١

تصنيع شركة إيثا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية(إيثا فارما)